


Odberová jednotka (pero a lancety)

Účel použitia

Odberové pero iHealth a lancety iHealth boli špeciálne vyvinuté ako príslušenstvo k systému monitorovania glukózy v krvi a sú určené na odber vzoriek krvi z bruška prsta alebo z iných miest tela za účelom sledovania hladiny glukózy v krvi.

Dôležité: Odberové pero a lancety iHealth sú určené len na jednorazové použitie pre vlastnú potrebu. Nie sú vhodné pre používanie v lekárskej praxi. Lancety nepoužívajte opakovane ani spoločne s inými osobami.


Jednotlivé súčasti odberovej jednotky



Použitie odberového pera s lancetou

1. Odstránenie krytky

Z odberového pera stiahnite krytku



2. Vloženie lancety


Zasuňte novú lancetu pevne do bielej krytky pre uchytanie lancety

Poznámka: Vtlačením lancety do krytky sa môže odberové pero napnúť. Nepoužívajte lancetu, ak bola už predtým krytka odstránená.

3. Odstránenie ochranného disku

Jednou rukou pevne držte lancetu a druhou rukou otáčaním odstráňte ochranný disk.


Poznámka: Ochranný disk lancety je kontaminovaný, preto ho po použití zlikvidujte do kontajneru odolného proti prepichnutiu.



4. Opäťovné nasadenie krytky na odberové pero

Krytku znova nasadte na odberové pero tak, aby počutelne klikla (zaklapla). Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli nechránenej ihly lancety.

Pre odber z prsta použite krytku odberového pera. Priehľadnú krytku použite na odber z iných miest, t.j. rameno predlaktie, dlaň, stehno a lýtko.



5. Nastavenie odberového pera

Odberové pero sa dá nastaviť na päť rôznych úrovni hĺbky. Úroveň 1 je minimálna a úroveň 5 maximálna hĺbka. Otáčaním krytky nastavte požadovanú hĺbku podľa zobrazenia v okienku indikátora (ukazovateľa) hĺbky. Pokyny pre nastavenie hĺbky lancety:

- 1 pre jemnú /tenkú pokožku
- 2 – 3 pre stredne hrubú pokožku
- 4 – 5 pre hrubú /mozoľnatú pokožku



6. Napnutie rúčky

Otáčajte hlavou v smere šípky až kým nepočujete kliknutie a ďalej sa už hlavou nedá otáčať. (Rúčku ste mohli napnúť už v kroku 2) Teraz môžete urobiť odber a otestovať si hladinu glukózy v krvi.



Výber preferovaného miesta odberu (testovania)

Varovanie: Ak vykonávate test na hypoglykémiu (nízka hladina glukózy v krvi) alebo ak neviete, či netrpíte na hypoglykémiu, odporúčame urobiť odber z prsta.

Odber z prsta

- a. Nastavte si hĺbku na odberovom peru na úroveň 1.
- b. Odberovým perom (s krytkou) jemne zatlačte na bok bruška prsta. (Pre optimálne výsledky


robte odber v tieni.)

c. Stlačte spúšťacie tlačidlo

d. V prípade potreby zatlačte jemne na prst, až kým sa nevytvorí kvapka krvi o veľkosti špendlíkovej hlavičky (príklad: •).

e. Ďalšie informácie o testovaní glukózy v krvi ako súčasti systému monitorovania hladiny glukózy v krvi nájdete vo svojej užívateľskej príručke.

Poznámka: Hodnoty glukózy v krvi z ramena, predlaktia, dlane, stehna a lýtka nie sú vždy identické s výsledkami odberu z bruška prsta. Nerobte testovanie zo žiadneho iného miesta než z prsta v prípade, ak hladina glukózy rýchlo stúpa alebo klesá, počas doby kratšej ako 2 hodiny po jedle, po aplikácii inzulínu, bezprostredne po cvičení či inom pohybe alebo ak ste chorí resp. pod stresom.




Odber z predlaktia, ramena, dlane, stehna a lýtka

Aby ste dostali čerstvú krv na povrch testovacieho miesta, niekolko sekúnd si toto miesto silno masírujte, až kým sa citel'ne nezahreje.

Odberovým perom si vpichnite do testovacieho miesta a:

a. Držte priehľadnú krytku proti povrchu miesta testovania.

Stlačte spúšťacie tlačidlo. Nevyťahujte.



b. Silno tlačte na odberové pero až kým sa nevytvorí potrebná kvapka krvi.

c. Odberové pero v kolmom smere vytiahnite a dávajte pozor, aby ste nerozmazali vzorku krvi na testovanom mieste.

Dôležité:

a. Odber si nerobte v miestach s viditeľnými žilami alebo pečeňovými škvŕnami, aby ste predišli nadmernému krvácaniu.

b. Na odber krvi si nevyberajte ani miesta, kde sú šlachy alebokíbové kostičky (napr. na rukách a v oblasti členkov).

c. Potrebná je kvapka krvi o veľkosti $0,7 \text{ cm}^2$, čo približne zodpovedá veľkosti špendlíkovej hlavičky (príklad: •). Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k systému monitorovania glukózy v krvi.



Vyberanie (odstránenie) použitej lancety

Po vykonaní testu vyberte lancetu z odberového pera tak, že stlačíte nadol posuvné tlačidlo na vyberanie lancety a takto ho držíte, až kým lanceta nevypadne. Potom tlačidlo vráťte v smere šípky do pôvodnej polohy.

Dabajte na to, aby ste použitú lancetu riadne likvidovali do kontajnera odolného proti prepichnutiu.

Čistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia sú pre testovací proces absolútne nevyhnutné, pretože čistenie zabezpečuje, aby odberové pero dobre fungovalo a dezinfekcia zabráňuje tomu, aby ste vy alebo iné osoby boli ohrozeni infekciou, resp. krízovou infekciou.

Dôrazne vás upozorňujeme na to, aby ste po každom použití

glukomer a odberové pero dôkladne očistili a vydezinfikovali. Zároveň vám odporúčame použiť nasledovný produkt: CaviWipes (dezinfekčné utierky) (registračné číslo EPA: 46781-8).

Dezinfekčné utierky CaviWipes, obsahujúce izopropanol a diizobutyl-fenoxy-etoxyetyl-dimetylbenzyl-chlorid amónny ako účinnú látka, sa pri používaní pre glukomery a odberové perá ukázali ako absolútne bezpečné.

Informácie o produkте, možnosti kúpy a technické údaje nájdete na webstránke: www.metrex.com alebo ak budete kontaktovať Metrex na čísle: +1-800-841-1428.

a. Pred testovaním si užívateľ musí očistiť a umyť ruky.

b. Po ukončení testu použite dezinfekčné utierky CaviWipesTM (Metrex® Research Corporation, EPA Reg. No. 46781-8, EPA Est. No. 56952-WI-001) na očistenie a dezinfekciu odberového pera v trvaní 180 sekúnd.

Poznámka:

1. Každý krok uskutočnovanej dezinfekcie si vyžaduje predčistenie.
2. Teleso odberového pera nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste.

3. Po použíti odberového pera si vždy dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
4. Ak máte nejaké otázky, volajte číslo +1-855-816-7705.

5. Podrobnejšie informácie nájdete na týchto kontaktných stránkach:

„Oznámenie FDA pre verejné zdravotníctvo: Používanie odberového pera pre odber z prsta viacerými než jednou osobou predstavuje riziko prenosu pôvodcov chorôb

prenášaných krvou: Úvodné oznámenie“ (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm 224025.htm>, „Klinická pripomienka CDC: Používanie odberového pera pre odber z prsta viacerými než jednou osobou predstavuje riziko prenosu pôvodcov chorôb prenášaných krvou“ (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Model produktu: ASL-602 (ADL-602)

Výhradný dovozca pre SR: EasyCo s.r.o.

Bezová 1658/1, budova Golden Office, 147 00 Praha 4, Česká republika
info@easystore.cz, +420 261 211 521, www.easystore.cz

Vyrobené pre iHealth Lab Inc.

USA:

iHealth Lab Inc. www.ihealthlabs.com
Mountain View, CA 94043, USA
+1-855-816-7705 (8:30 AM-5:00 PM PST, pondelok až piatok)

Európa:

 iHealthLabs Europe SARL www.ihealthlabs.eu
3 Rue Tronchet, 75008, Paris, France
+33(0)1 44 94 04 81 (9:00 AM-5:30 PM, pondelok až piatok)



Andon Health Co., Ltd.
No.3 JinPing Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin, China
Vyrobené v Číne

SYMBOLY:



Pokyny pre testovanie pozri v užívateľskej príručke



Sériové číslo